ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЯНИХ ЛУЧИХ ТРАВСТОЇВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

Л. М. БУРКО, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач

<https://orcid.org/0000-0003-0638-0481>

Національний університет біоресурсів і природокористування України

E-mail: Lesya1900@i.ua

І. В. СВИСТУНОВА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

<https://orcid.org/0000-0001-8922-1261>

Національний університет біоресурсів і природокористування України

E-mail: irinasv@ukr.net

С.П. ПОЛТОРЕЦЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, професор

<https://orcid.org/0000-0003-3334-0880>

Уманський національний університет садівництва

E-mail: poltorec@gmail.com

Т. І. ПРОРОЧЕНКО, кандидат сільськогосподарських наук

<https://orcid.org/0000-0002-5337-8459>

E-mail: prorochenko1992@gmail.com

<https://doi.org/dopovidi2021.04.009>

Анотація. Наведено результати досліджень щодо впливу видового складу травосумішок, рівня удобрення та стимулятора росту Фумар на продуктивність сіяних лучних травостоїв на чорноземах типових малогумусних Лісостепу правобережного

Експериментальна частина роботи виконана в наукових лабораторіях кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології у виробничому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Агрономічна дослідна станція». Територія дослідної станції розташована у Правобережному Лісостепу і входить до складу Білоцерківського агрогрунтового району. Дослідні ділянки було закладено на чорноземах типових малогумусних великопилюватих легкосуглинкових за механічним складом, які характеризуються високим вмістом валових і рухомих форм поживних речовин. Клімат регіону характеризується нестійким зволоженням та помірним температурним режимом. Середня річна температура повітря складає 6-8°C. Річна сума опадів досягає 562 мм, за вегетаційний період – 354-394 мм (63-70 % від річної норми), які упродовж року випадають нерівномірно.

У середньому за перші три роки користування найвпливовішим чинником за виходом з 1 га сухої маси є чинник травостій із часткою участі 60 %. Частка чиннику удобрення становить 40 %.

Включення до бобово-злакових травосумішей люцерни посівної, а також використання на кормові цілі одновидового її посіву порівняно із злаковим

Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І.

травостоем на фонах без внесення мінерального азоту в середньому за перші три роки користування підвищує продуктивність сіяних травостойів від 5,12–5,54 до 10,44–10,78 т/га сухої маси, від 3,74–4,10 до 8,06–8,68 т/га кормових одиниць, від 0,57–0,66 до 1,70 1,96 сирого протеїну і від 38,9–42,7 до 82,4–91,3 ГДж/га обмінної енергії або в 1,8–3,0 раза, тоді як на фонах із внесенням N_{60} – відповідно від 7,28–7,59 до 9,42–9,71 т/га, від 5,73–5,93 до 8,27–9,22 т/га, від 1,13–1,21 до 1,89–2,29 т/га і від 59,6–61,7 до 89,4–98,2 ГДж/га, або лише в 1,4–1,6 раза.

Поміж люцерно-злакових травостойів у перші два роки користування найпродуктивнішим виявився агроценоз, злакова частина якого представлена стоколосом безостим і пажитницею багаторічною.

Найменшу, проте досить високу продуктивність люцерновий і люцерно-злаковий травостой забезпечують без внесення добрив, що в середньому за перші три роки користування коливається в межах 9,95–10,86 т/га сухої маси, 1,70–1,85 т/га сирого протеїну, 82,4–85,8 ГДж/га обмінної енергії, тоді як злакові травостой відповідно 5,12 т/га, 3,74 т/га, 0,57 т/га, 38,9 ГДж/га.

Ключові слова: продуктивність, видовий склад, удобрення, люцерна посівна, злаковий травостій

Актуальність. Створення на лучних угіддях сіяних бобово-злакових травостойів дає можливість істотно підвищити їхню продуктивність, білковість і енергонасиченість кормів, значно зменшити витрати технічного азоту, істотно скоротити витрати енергії, а також зменшити негативний вплив на довкілля азотних добрив, що в сучасних умовах екологічної й енергетичної кризи набуває надзвичайно важливого значення для сільськогосподарського виробництва. Крім того, поява нових сортів та нових уявлень про рослинні лучні угруповання, стратегію лучних трав в агроценозах тощо зумовило проведення спеціальних досліджень із добору кращих бобових і злакових компонентів для бобово-злакових

травостойів, що, безперечно, актуально.

Створення сіяних травостойів із підвищеним вмістом бобових – один із найперспективніших напрямів інтенсифікації луківництва у світі (Hannaway and other, 2018). Часткова заміна мінерального азоту симбіотичним являє собою важливий резерв скорочення витрат енергії, на який на злакових травостоях інтенсивного типу часто припадає половина її сукупних витрат (Кургак, 2010; Кургак&Лук'янець, 2004; Соляник, 2000).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями, проведеними в різних географічних, кліматичних, едафічних умовах із різними видами бобових трав виявлено, що включення бобових до складу бобово-злакових ценозів без

Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І.

внесення мінерального азоту підвищує продуктивність лучних угідь у 1,5–2,5, а за збором протеїну – у 2–3 рази порівняно зі злаковими травостоями на тому ж фоні РК (Волошин, 2017; Волошин&Сукайло, 2014; Кургак, 2010; Nilsdotter-Linde and other, 2016). Водночас використання бобових трав у складі бобово-злакових травостоїв замінює внесення на злаковий травостій 100–300 кг/га мінерального азоту.

Основним принципом за добору видів і сортів для бобово-злакових травосумішок слугує відповідність компонентів комплексу фізичних умов середовища (рівню зволоження, кліматичним і ґрунтовим), віолентним властивостям ценопопуляцій видів, з яких складається певне лучне угруповання (вони мають характеризуватися приблизно однаковою ценотичною активністю), та антропогенним чинниками (режиму використання, системі удобрення й догляду тощо). Бобові трави мають добре утримуватися й виявляти високу продуктивність у змішаних посівах, злакові – сприяти формуванню щільної дернини і збалансованості корму, не впливати пригнічуюче на бобові трави (Боговін, 2009; Векленко, 2003; Демидась та ін, 2019;

Кургак&Лук'янець, 2004; Оліфірович, 2008; Слюсар, 2002; Ярмолюк, 2001).

Мета дослідження полягає у встановленні закономірностей формування високої продуктивності сіяних багаторічних травостоїв залежно від видового складу та удобрення на чорноземах типових малогумусних Лісостепу правобережного.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження виконували у наукових лабораторіях кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології у виробничому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Агрономічна дослідна станція» упродовж 2014-2016 рр. Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий малогумусний, за гранулометричним складом великопилювато-середньосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі (за Тюрінім) становить 4,34 %, рН сольової витяжки – 6,8 ємність вбирання – 307 мг-екв/кг ґрунту, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 101 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору та обмінного калію (за Чиріковим) – відповідно 113 і 91 мг/кг ґрунту. Схему досліду наведено у табл.1.

1. Схема досліду

№ з/п	Чинник А – травостій (види трав та норма висіву їх насіння, кг/га)
1	Люцерна посівна, 16
2	Люцерна посівна, 12 + костриця східна, 10 + костриця лучна, 8

Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І.

3	Люцерна посівна, 10 + костриця східна, 10 + грястиця збірна, 8
4	Люцерна посівна, 10 + стоколос безостий, 14 + пажитниця багаторічна, 10
5	Люцерна посівна, 10 + стоколос безостий, 14 + костриця східна, 8
6	Стоколос безостий, 14 + костриця східна, 8 (злаковий травостій), контроль
№ з/п	Чинник В – удобрення (поживні елементи та їх дози)
1	Без добрив, контроль
2	P60 K90
3	N60P60K90
4	N60P60K90 + стимулятор росту Фумар

Площа посівної ділянки – 30 м², облікової – 25 м², повторність досліду чотириразова.

Технологія вирощування багаторічних трав за виключенням досліджуваних чинників була загальноприйнятою для Правобережного Лісостепу України. У досліді були висіяні наступні види багаторічних трав: люцерна посівна (*Medicago Sativa L.*), сорт Регіна; стоколос безостий (*Bromus inermis Leyss*), сорт Марс; пажитниця багаторічна (*Lolium perenne L.*), сорт Київська 101; костриця східна (*Festuca arundinacea Schreb.*), сорт Данка; костриця лучна (*Festuca pratensis Huds*), сорт Діброва; грястиця збірна (*Dactylis glomerata L.*) сорт Наталка.

Результати досліджень та їх обговорення. Як показав аналіз результатів проведених досліджень у середньому за перші три роки користування, а саме за 2014–2016 рр. більш впливовим чинників за виходом з 1 га сухої маси виявився чинників травостій з загальною часткою 60 % (табл. 2). Частка чинників удобрення становила 40 %. Варто зазначити, що у перший рік

частка впливу чинника травостій була найбільшою. З роками користування через зменшення кількості бобового компонента та певної витрати дії симбіотичного азоту, а саме люцерни посівної вплив чинника травостій трохи зменшився – від 61 % у 1-й рік до 53 % у 3-й. При цьому навпаки, вплив чинника удобрення з роками трохи збільшився.

Виявлено високу ефективність включення до бобово-злакових травосумішей люцерни посівної, як джерела симбіотичного азоту, особливо на фонах без внесення мінерального азоту. Продуктивність травостою від її введення порівняно злаковим травостоєм із тими ж злаковими компонентами на фонах без внесення азоту (варіанти без добрив і P₆₀K₉₀) у середньому за 2014–2016 рр. підвищилася від 5,12–5,54 до 10,44–10,78 т/га сухої маси, або в 1,9–2,0 раза, тоді як на фонах із внесенням азоту (варіанти N₆₀P₆₀K₉₀ і N₆₀P₆₀K₉₀+Фумар) – від 7,64–7,91 до 11,14–11,47 т/га сухої маси, або в 1,5 раза. На фонах із внесенням азоту найменше зростання продуктивності (від 7,28–7,59 до 9,42–9,71 т/га сухої маси або в

Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І.

1,3 раза) відбулося від включення стоколосу безостого і костриці люцерни посівної до суміші злаків із східної у 3-й рік користування.

2. Продуктивність сіяних лучних травостоїв на різних фонах удобрення за роками їх користування на суходолі Правобережного Лісостепу, т/га сухої маси (середнє за 2014–2016 рр.)

Удобрєння	Рік користування			Середнє
	1-й	2-й	3-й	
Люцерна посівна				
Без добрив	11,44	9,92	8,49	9,95
P ₆₀ K ₉₀	11,83	10,29	8,73	10,28
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	12,04	10,54	8,99	10,52
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	12,30	10,82	11,41	11,51
Люцерна посівна + костриця східна + костриця лучна				
Без добрив	12,58	10,74	7,58	10,30
P ₆₀ K ₉₀	12,80	11,05	7,89	10,58
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	13,08	11,26	8,38	10,88
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	13,38	11,42	8,76	11,19
Люцерна посівна + костриця східна + грєстиця збірна				
Без добрив	12,40	10,68	8,75	10,61
P ₆₀ K ₉₀	12,74	11,26	9,32	11,11
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	13,26	11,42	9,81	11,50
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	13,82	11,48	10,11	11,80
Люцерна посівна + стоколос безостий + пажитниця багаторічна				
Без добрив	13,72	11,42	7,43	10,86
P ₆₀ K ₉₀	13,88	11,97	7,95	11,27
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	14,12	12,06	8,67	11,72
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	14,28	12,25	9,09	11,87
Люцерна посівна + стоколос безостий + костриця східна				
Без добрив	12,89	9,91	8,51	10,44
P ₆₀ K ₉₀	12,78	10,68	8,87	10,78
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	13,06	10,95	9,42	11,14
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	13,40	11,29	9,71	11,47
Стоколос безостий + костриця східна (злаковий травостій)				
Без добрив	6,42	4,92	4,02	5,12
P ₆₀ K ₉₀	6,85	5,29	4,48	5,54
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	10,09	8,54	7,28	8,64
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	10,31	8,82	7,59	8,91
НІР ₀₅ , т/га за чинникамицфі				
Травостій	0,68	0,52	0,63	0,60
Удобрєння	0,44	0,32	0,42	0,40
Частка чинників, %				
Травостій	64	61	56	60
Удобрєння	36	39	45	40

Поміж люцерно-злакових травостоїв за усередненими даними достовірно (за НІР₀₅ 0,41 т/га сухої маси) продуктивнішими були

Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І.

агроценози за участі стоколосу безостого та грястиці збірної (із злаковою частиною у складі костриця східна + грястиця збірна, стоколос безостий + пажитниця багаторічна і стоколос безостий + костриця східна), продуктивність яких у варіанті без добрив коливалася в межах на фоні без добрив 10,44–10,86 т/га сухої маси, на фоні внесення $P_{60}K_{90}$ – 10,78–11,27, $N_{60}P_{60}K_{90}$ – 11,14–11,72 і на фоні $N_{60}P_{60}K_{90} + \text{Фумар}$ – 11,47–11,97 т/га. Поміж зазначених сумішей найпродуктивнішою визначена суміш у складі: люцерна посівна + стоколос безостий + пажитниця багаторічна.

Наймеш продуктивною виявилася суміш у складі люцерна посівна + костриця східна + костриця лучна, продуктивність якої коливалася у межах – відповідно 10,30, 10,58, 10,88 і 11,19 т/га сухої маси.

Найменшу продуктивність на всіх травостоях одержали у варіанті без добрив – у середньому три роки на одновидовому посіві 9,95 т/га сухої маси, на люцерно-злакових – 10,30–10,86 т/га і на злаковому – 5,12 т/га. За внесення $P_{60}K_{90}$ продуктивність усіх травостоїв збільшилася тільки на 3–8 %, але достовірно. За додавання до $P_{60}K_{90}$ ще й N_{60} продуктивність досліджуваних травостоїв збільшувалася достовірно, але не однаково. Якщо приріст урожаю люцерни посівної і люцерно-злакових травостоїв у середньому за роки досліджень збільшився лише на 2–

4 %, то на злаковому травостої – на 38 %, або в 1,4 раза. Отже, за приростом продуктивності ефективнішим стало внесення азоту на злаковому травостої. Проте, варто відмітити, що на бобово-злакових травостоях у 3-й рік користування прирости врожаю від внесення N_{60} становили 9 % і були дещо більшими порівняно з 1-м роком із показниками 1–2 %, які безперечно були несуттєвими.

Під час аналізу дії добрив виявилось, що найбільшу продуктивність на всіх травостоях забезпечило поєднане внесення повного мінерального добрива і біостимулятора росту Фумар ($N_{60}P_{60}K_{90} + \text{Фумар}$), де продуктивність порівняно з варіантом без внесення добрив у середньому за роки досліджень на одновидовому посіві люцерни збільшилася на 0,89 т/га сухої маси або на 9 %, на її сумішах із злаками – на 0,89–1,19 т/га, або на 9–11 %, і на злаковому травостої – на 2,79 т/га, або на 54 % за НІР 0,41 т/га. Продуктивність від застосування біостимулятора росту Фумар збільшилася на 0,27–0,32 т/га сухої маси або на 2–4 % і мало залежала від видового складу травостою.

Аналіз одержаних даних за узагальнюючими показниками продуктивності, а саме за виходом з 1 га кормових одиниць, сирого протеїну, валової й обмінної енергії показав, що закономірності, які

Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І.
 одержані за виходом з 1 га сухої маси (табл. 3).
 зберігалися й за цими показниками

3. Продуктивність багаторічних травостоїв залежно від систем удобрення за узагальнюючими показниками, (середнє за 2014–2016 рр.)

Удобрєння	Кормові одиниці, т/га	Сирий протеїн, т/га	Валова енергія, ГДж/га	Обмінна енергія, ГДж/га
Люцерна посівна				
Без добрив	8,06	1,74	182,1	83,6
P ₆₀ K ₉₀	8,42	1,86	188,1	87,4
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	8,62	2,01	192,5	89,4
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	8,89	2,16	198,4	92,1
Люцерна посівна + костриця східна + костриця лучна				
Без добрив	7,83	1,70	188,5	82,4
P ₆₀ K ₉₀	8,15	1,80	193,6	85,7
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	8,27	1,89	199,1	89,2
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	8,62	2,06	204,8	91,8
Люцерна посівна + костриця східна + грєстиця збірна				
Без добрив	8,06	1,78	194,2	84,9
P ₆₀ K ₉₀	8,67	1,88	203,3	90,0
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	8,99	2,12	210,5	94,3
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	9,09	2,19	215,9	96,8
Люцерна посівна + стоколос безостий + пажитниця багаторічна				
Без добрив	8,25	1,85	198,7	85,8
P ₆₀ K ₉₀	8,68	1,96	206,2	91,3
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	9,14	2,20	214,5	94,9
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	9,22	2,29	219,1	98,2
Люцерна посівна + стоколос безостий + костриця східна				
Без добрив	7,93	1,77	191,1	83,5
P ₆₀ K ₉₀	8,30	1,87	197,3	87,3
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	8,47	2,08	203,9	91,3
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	8,83	2,18	209,9	94,1
Стоколос безостий + костриця східна (злаковий травостій)				
Без добрив	3,74	0,57	93,7	38,9
P ₆₀ K ₉₀	4,10	0,66	101,4	42,7
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	5,73	1,13	139,8	59,6
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀ + Фумар	5,93	1,21	144,8	61,7

Виявлено високу ефективність включення до бобово-злакових травосумішей люцерни посівної, а також використання на кормові цілі одновидового посіву люцерни, особливо на фонах без внесення мінерального азоту. Продуктивність зазначених травостоїв порівняно із

злаковим травостоєм на фонах без внесення азоту (варіанти без добрив і P₆₀K₉₀) у середньому за 2014–2016 рр. підвищилася від 3,74–4,10 до 8,06–8,68 т/га кормових одиниць, від 0,57–0,66 до 1,70–1,96 сирого протеїну, від 93,7–101,4 до 182,1–206,2 ГДж/га валової енергії і від 38,9–42,7 до 82,4–

Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І.

91,3 ГДж/га обмінної енергії або в 1,8–3,0 раз, тоді як на фонах із внесенням азоту (варіанти $N_{60}P_{60}K_{90}$ і $N_{60}P_{60}K_{90}+$ Фумар) – відповідно від 5,73–5,93 до 8,27–9,22 т/га, від 1,13–1,21 до 1,89–2,29 т/га, від 139,8–144,8 до 192,5–219,1 ГДж/га, і від 59,6–61,7 до 89,4–98,2 ГДж/га, або в 1,4–1,6 раз. Порівняння продуктивності люцерно-злакових сумішей із одновидовим посівом люцерни свідчить, що на одних і тих же фонах вона знаходилася на одному рівні з незначними коливаннями.

Найбільшу продуктивність за зазначеними у таблиці 3 показниками на всіх травостоях забезпечило поєднане внесення повного мінерального добрива і біостимулятора росту Фумар ($N_{60}P_{60}K_{90}+$ Фумар), де порівняно з ділянками без внесення добрив у середньому за роки досліджень на люцерновому і люцерно-злакових травостоях вона збільшилася відповідно до 8,62–9,22 т/га, 2,06–2,29 т/га, 204,8–219,1 ГДж/га і 91,8–98,2 ГДж/га, або на 10–18 % і на злаковому травостої – до 5,93 т/га, 1,21 т/га, 144,8 ГДж/га і 61,7 ГДж/га, або в 1,5–2,1 раз. Продуктивність за цими ж показниками від застосування біостимулятора росту Фумар збільшилася на 3–7 % і мало залежала від видового складу травостою.

Висновки і перспективи. Дослідженнями встановлено, що в технології вирощування бобово-злакових травостоїв важливими

елементами, від яких залежать щільність та ботанічний склад рослин є вдале поєднання їх видового складу, оптимізація фонів удобрення та стимуляція біостимулятором росту Фумар.

У середньому за перші три роки користування найвпливовішим чинником за виходом з 1 га сухої маси є чинник травостій з часткою участі 60 %. Частка чинника удобрення становить 40 %.

Включення до бобово-злакових травосумішей люцерни посівної, а також використання на кормові цілі одновидового її посіву порівняно зі злаковим травостоєм на фонах без внесення мінерального азоту в середньому за перші три роки користування підвищує продуктивність сіяних травостоїв від 5,12–5,54 до 10,44–10,78 т/га сухої маси, від 3,74–4,10 до 8,06–8,68 т/га кормових одиниць, від 0,57–0,66 до 1,70 1,96 сирого протеїну і від 38,9–42,7 до 82,4–91,3 ГДж/га обмінної енергії або в 1,8–3,0 раз, тоді як на фонах із внесенням N_{60} – відповідно від 7,28–7,59 до 9,42–9,71 т/га, від 5,73–5,93 до 8,27–9,22 т/га, від 1,13–1,21 до 1,89–2,29 т/га і від 59,6–61,7 до 89,4–98,2 ГДж/га, або лише в 1,4–1,6 раз.

Поміж люцерно-злакових травостоїв у перші два роки користування найпродуктивнішим виявився агроценоз, злакова частина якого представлена стоколосом

Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І.

безостим і пажитницею багаторічною.

Найменшу, проте досить високу продуктивність люцерновий і люцерно-злаковий травостої забезпечують без внесення добрив, що в середньому за перші три роки

користування коливається в межах 9,95–10,86 т/га сухої маси, 1,70–1,85 т/га сирого протеїну, 82,4–85,8 ГДж/га обмінної енергії, тоді як злакові травостої відповідно 5,12 т/га, 3,74 т/га, 0,57 т/га, 38,9 ГДж/га.

References

1. Bohovin, A. V. (2009) Vymohy do doboru vydiv trav i travosumishey dlya stvorenniya siyanykh riznoho hospodars'koho vykorystannya. [Requirements for the selection of types of grasses and grass mixtures for the creation of sown for various economic uses]. *Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva UAAN»*. 3. P. 112–120.

2. Veklenko, YU. A. (2003) Rezhymy vykorystannya ta urozhaynist' riznotypnykh ukisno-pasovyshchnykh travostoyiv. [Modes of use and yield of different types of sloping pastures]. *Kormy i kormovyrobnytstvo*. 50. P. 44–49.

3. Voloshyn V. N. (2017) Botanichnyy sklad ta produktyvnist' luhovykh travostoyiv na seriynykh lisovykh povakh. [Botanical composition and productivity of meadow grasslands on serial forest cover]. *Vestnyk Bilorus'koyi derzhavnoyi sil's'kohospodars'koyi akademiyi*. 1. P. 62–66.

4. Voloshyn, V. M., Sukaylo, M. V. (2014) Produktyvnist' bobovo-zlakovykh travostoyiv na sirykh lisovykh gruntakh Lisostepu.. [Productivity of leguminous-cereal stands on gray forest soils of the Forest-Steppe]. *Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva UAAN»*. 3. P. 142–148.

5. Demydas', H. I., Prorochenko, S. S., Burko, L. M. (2019) Shchil'nist' i vysota bahatorichnykh ahrofitotsenoziv zalezno vid vydovoho skladu ta udobrennya. [Density and height of perennial agrophytocenoses depending on species composition and fertilizer]. *Tavriys'kyy naukovyy visnyk*. 105. P. 49–55.

6. Hannaway D. B., Brewer L. J., Ates S., Anderson N. P., Wang G., Filley S., Daly C., Halbleib M. D., Ringo C., Monk S., Moot D. J., Yang X., Chapman D. F. and Sohn P. (2018) Ftatch clover: optimal selection of clover

species. Sustainable meat and milk production from grasslands: Proceedings of the 27th General fteeting of the European Grassland Federation. P. 218–220. (in Ireland)

7. Kurhak V. H. (2010) Luchni ahrofitotsenozy. [Meadow agrophytocenoses]. 374. (in Ukrainian)

8. Kurhak V. H., Voloshyn V. M. (2017) Pidvyshchennya efektyvnosti vykorystannya bahatorichnykh bobovykh trav na lukakh Ukrayiny. [Improving the efficiency of perennial legumes in the meadows of Ukraine]. *Posibnyk ukrayins'koho khliboroba «Biolohizatsiya zemlerobstva»: Naukovo-praktychnyy zbirnyk*. 1. P. 288–291.

9. Kurhak, V. H., Luk"yanets', O. P. (2004) Vplyv typu travostoyu, system udobrennya ta vykorystannya na produktyvnist' sukhodil'nykh luchnykh uhid' pivnichnoho Lisostepu Ukrayiny. [Influence of grass type, fertilizer systems and use on the productivity of dry meadow lands of the northern Forest-Steppe of Ukraine]. *Zbirnyk naukovykh prats' Vinnyts'koho DAU*. 17. P. 9–15.

10. Kurhak, V. H., Luk"yanets', O. P. (2002) Formuvannya luchnykh travostoyiv na uhiddyakh, vyvedenykh z rilli. [Formation of meadow grasslands on arable land]. *Visnyk Bilotserkivs'koho DAU*. 24. P. 137–145.

11. Nilsson-Linde N., Halling M. A. and Jansson J. (2016) Widening the harvest window with contrasting grass-clover mixtures. The multiple roles of grassland in the European bioeconomy: Proceedings of the 26th General Meeting of the European Grassland Federation. P. 191–193. (in Norway)

12. Olifirovych, V. O. (2008) Bobovo-zlakovi travosumishky – osnova vyrobnytstva yakisnykh vysokobilkovykh kormiv na skhylovykh zemlyakh. [Legume-cereal grass mixtures are the basis for the production of high-quality high-protein feeds on sloping

Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І.

lands]. *Kormy i kormovyrobnytstvo*. 61. P. 118–123.

13. Slyusar, S. M. (2002) Vplyv rezhymiv udobrennya ta vykorystannya riznodostyhayuchykh travosumishok na yikh produktyvnist'. [Influence of fertilizer regimes and use of different-reaching grass mixtures on their productivity]. *Visnyk ahraryoi nauky*. 9. P. 85–86.

14. Solianyuk O. P. (2000) Produktyvnist' bobovo-zlakovykh travosumishok zalezhno vid rezhymiv yikh vykorystannya na nizynnykh lukakh Polissya Ukrayiny. [Productivity of

legume-cereal grass mixtures depending on the modes of their use in lowland meadows of Polissya of Ukraine]. 18. (in Ukrainian)

15. Yarmolyuk, M. T., (2001) Ahroekologichni osnovni stvorennia i vykorystannya kul'turnykh pasovyshch u zakhidnykh rehionakh Ukrayiny. [Agroecological basic creation and use of cultural pastures in the western regions of Ukraine]. *Vydavnytstvo Instytutu zemlerobstva i tvarynnystva zakhidnoho rehionu UAAN «Sil's'kyi hospodar»*. 248. (in Ukrainian)

PRODUCTIVITY OF SOWN MEADOW HERBAGE DEPENDING ON THE ELEMENTS OF GROWING TECHNOLOGY

L. M. Burko, I. V. Svystunova, S. P. Poltoretskyi T. I. Prorochenko

Abstract. *The results of research on the influence of species composition of grass mixtures, the level of fertilizing, and growth stimulator Fumar on the productivity of sown meadow herbage on typical low-humus chernozems of the Right-Bank Forest-Steppe are presented.*

The experimental part of the work was performed in the scientific laboratories of the Forage Production, Land Reclamation, and Meteorology Department in the production unit of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Agronomic Research Station". The territory of the research station is located in the Right-Bank Forest-Steppe and is a part of Bila Tserkva agro-soil district. The experimental plots were laid on typical low-humus chernozems, coarse-grained light loam in terms of mechanical composition, which are characterized by a high content of gross and mobile forms of nutrients. The climate of the region is characterized by unstable humidity and moderate temperatures. The average annual air temperature is 6-8 ° C. The annual amount of precipitation reaches 562 mm, during the growing season - 354-394 mm (63-70% of the annual norm), which falls unevenly throughout the year.

On average, in the first three years of use, the most influential factor in the yield of 1 ha of dry mass is the factor of grass cover with a share of 60%. The share of fertilizer factor is 40%.

The inclusion of alfalfa in legumes and cereal mixtures, as well as the use of single-species sowing for fodder purposes compared to cereals in the background without mineral nitrogen on average for the first three years of use, increases the productivity of sown grasslands from 5.12-5.54 to 10.44–10.78 t/ha of dry weight, from 3.74–4.10 to 8.06–8.68 t/ha of feed units, from 0.57–0.66 to 1.70 1.96 of crude protein and from 38.9–42.7 to 82.4–91.3 GJ/ha of exchange energy or by 1.8–3.0 times, while on backgrounds with N₆₀ application - from 7.28–7.59, respectively, to 9.42–9.71 t/ha, from 5.73–5.93 to 8.27–9.22 t/ha, from 1.13–1.21 to 1.89–2.29 t/ha and from 59.6–61.7 to 89.4–98.2 GJ/ha, or only by 1.4–1.6 times.

Бурко Л. М., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І.

Among the alfalfa-cereal herbages in the first two years of use, the most productive was the agrocenosis, the cereal part of which is represented by smooth brome grass and English bluegrass.

The lowest, but quite high productivity of alfalfa and alfalfa-grass herbages is provided without fertilizers, which on average for the first three years of use ranges from 9.95 to 10.86 t/ha of dry weight, 1.70 to 1.85 t/ha of crude protein, 82.4–85.8 GJ/ha of metabolic energy, while cereals, respectively, 5.12 t/ha, 3.74 t/ha, 0.57 t/ha, 38.9 GJ/ha.

Keywords: *productivity, species composition, fertilizers, alfalfa, cereal-grass herbage*