



✍ **В.С. МАТВІЙЧУК**, студент
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Особливості розведення голубів породи кінг

Одним із шляхів збільшення асортименту м'яса птиці може бути використання голубів м'ясних порід. У багатьох країнах світу існує промислове м'ясне голубівництво (США, Франція, Угорщина та ін.). У таких державах як США, Італія, Угорщина, Франція та інших м'ясне голубівництво є високорозвинутим напрямом птахівництва. Для виробництва м'яса використовують різні породи голубів, у тому числі і породу кінг. Напрямок м'ясного голубівництва необхідно розвивати і в Україні, з метою розширення асортименту продукції птахівництва.

Хочу розповісти про особливості розведення голубів породи кінг в умовах нашого присадибного господарства у с. Повча, Дубенського району, Рівненської області.

При розведенні голубів, передусім, потрібно побудувати голуб'ятню. Вона може бути із дерева. Для однієї пари голубів потрібно від 0,3 до 1,0 м³ (ми маємо 5 пар птахів). У нашому господарстві голуб'ятня побудована на землі і має такі параметри: висота приміщення 2 м, довжина – 2,5 м, ширина – 2 м, розмір дверей – 60х180 см, розмір вікна – 80х75 см. Для вильоту голубів є спеціальне окреме віконце (25х20 см). Біля голуб'ятні встановлено вольєр із металеві сітки. Ширина вольєра 2,5 м, висота – 2 м, довжина – 3 м.

У голуб'ятні (на відстані 50 см від стелі) встановлено сідала діаметром близько 2 см. Гнізда розміром 50х50 см облаштовані на підлозі (можна їх розмішувати на невеличкій висоті від підлоги), оскільки кінги мають велику живу масу і їм важко злітати. Напувалка встановлена вакуумна, а годівниця – бункерна. Годуємо голубів зерновою сумішшю, яка містить горох, вику, просо, ячмінь, кукурудзу.

Голуби насиджують кладку із двох яєць. Спочатку самка зносить одне яйце, а друге – через добу. Насиджують кладку самець і самка по черзі. Тривалість ембріонального розвитку м'ясних голубів становить 17–19 діб, а якщо у голуб'ятні холодно, то пташенята з'являються пізніше – на 22–23-у добу. Виводяться голубенята без оперення. Пташенята сліпі і потребують піклування дорослих птахів. Відкривати очі голубенята починають не раніше третьої доби після вилуплення. Повністю очі у пташенят відкриваються приблизно на 9-у добу. Упродовж перших 6–7 діб самка годує пташенят воловим молочком – специфічною речовиною, яка з'являється у її волі наприкінці насиджування. Вже з 5-го тижня життя голубенята можуть годуватись самостійно. У віці 6–7 тижнів ми відлучаємо пташенят від батьків. Через 4 тижні після вилуплення голубенята мають живу масу до 600 г.

Не менш важливим при розведенні голубів є їх лікування та своєчасна вакцинація. Найстрашнішою хворобою для голубів є вертячка, при якій уражується центральна нервова система. Для профілактики цього захворювання використовуємо препарат "Лозеваль" (задаю орально по 2 краплі двічі на добу упродовж 5 діб).

Отже, при розведенні голубів важливим є досвід, який повинен передаватись від покоління до покоління. Розводити голубів породи кінг нескладно, вони невибагливі до умов утримання і годівлі. Птахи самостійно висиджують яйця і піклуються про майбутнє потомство. У віці 30 діб жива маса голубенят досягає 600 г. Однак м'ясних голубів породи кінг ми розводимо лише для краси. ■